

# ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата

## РИБОТАН

### для коррекции иммунодефицитных состояний животных

(Организация-разработчик – ЗАО фирма «НПВиЗЦ  
«ВЕТЗВЕРОЦЕНТР», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2)



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Российской Федерации  
Н. А. Власов  
09.02.2016 г.

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое название лекарственного препарата: Риботан (Ribotan).

Международное непатентованное название: низкомолекулярные полипептиды и фрагменты дрожжевой РНК.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Риботан содержит в 1,0 мл в качестве действующего вещества смесь низкомолекулярных полипептидов (не менее 10 мкг/мл) и фрагментов дрожжевой РНК (не менее 105 мкг/мл), а в качестве вспомогательных веществ – натрия хлорид и воду для инъекций.

3. По внешнему виду Риботан представляет собой прозрачный бесцветный раствор. Срок годности Риботана при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня производства. После первого вскрытия флакона препарат дальнейшему хранению не подлежит. Риботан запрещается применять по истечении срока годности.

4. Риботан выпускают расфасованным по 1 мл в стеклянные ампулы, по 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 100,0; 200,0 мл в стеклянные флаконы и по 450,0 мл в градуированные стеклянные бутылки, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Ампулы по 1 мл с препаратом упакованы в блистеры по 4 штуки. Блистеры по 5 штук уложены в коробки. Флаконы по 1 мл упакованы по 10 штук в коробки. Каждую потребительскую упаковку с препаратом снабжают инструкцией по применению.

5. Риботан хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2° до 10°С.

6. Риботан хранят в местах, недоступных для детей.

7. Ампулы и флаконы с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, а также остатки препарата, не использованные в течение 30 минут после вскрытия ампул (флаконов), утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта врача.

#### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Риботан относится к группе иммуномодулирующих препаратов.

10. Риботан обладает широким спектром биологической активности: ускоряет процессы регенерации, стимулирует факторы естественной резистентности, лейкопозз, миграцию и кооперацию Т- и В-лимфоцитов, фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов. Иммуномодулятор повышает резистентность организма, как при профилактическом, так и при терапевтическом применении, обладает антитоксическим действием. Ускоряет формирование поствакцинального иммунитета, повышая его напряженность и продолжительность. Увеличивает иммунологическую эффективность вакцин, повышает протективные свойства сыворотки крови и устойчивость иммунизированных животных к заражению патогенными микроорганизмами.

Риботан повышает содержание лизоцима, пропердина, уровень антител, индуцирует синтез интерферона.

Риботан по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности – веществам малоопасным согласно ГОСТ 12.1.007.

#### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Риботан применяют в комплексной терапии в качестве иммуномодулирующего средства при заболеваниях, сопровождающихся развитием иммунодефицита, в том числе при агранулоцитозе и лейкопениях, как неспецифическое средство, способствующее профилактике и лечению вирусных, бактериальных, грибковых и паразитарных болезней, а также для усиления эффекта вакцинации при заблаговременном или одновременном с вакциной применении.

Риботан эффективен для предупреждения и ослабления последствий стрессовых состояний у животных при транспортировке, в предоперационный и послеоперационный периоды, а также при лечении различных незаразных болезней в комплексе с другими лекарственными препаратами.

12. Противопоказаний для применения Риботана не установлено, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

13. Риботан вводят животным подкожно или внутримышечно.

**Дозы Риботана для различных видов животных.**

Вид животного	Доза, мл		
	Взрослые животные	Молодняк старше 3-х месяцев	Молодняк до 3-х месяцев
Крупный рогатый скот, лошади, верблюды	5,0-6,0	3,0-5,0	1,0-3,0
Свиньи	2,0-4,0	1,0-2,0	0,5-1,0
Мелкий рогатый скот	1,0-2,0	1,0	0,5-1,0
Собаки, кошки, пушные звери, кролики, нутрии	1,0-2,0	1,0-1,5	0,5-1,0

Для профилактики инфекционных заболеваний Риботан вводят однократно 2-3 раза в месяц, с лечебной целью – один раз в сутки в течение 3-5 дней.

В начальной стадии заболевания Риботан вводят 2-3 кратно с интервалом 3-5 дней, при необходимости через 10-15 дней курс лечения повторяют.

14. Симптомы передозировки не установлены.

15. Особенностей действия лекарственного препарата при первом введении и при его отмене не выявлено.

16. Противопоказаний и особенностей применения препарата беременным животным, животным в период лактации, потомству животных не установлено.

17. Следует избегать нарушения рекомендованной схемы применения препарата во избежание снижения его эффективности. В случае пропуска введения одной или нескольких доз препарата необходимо продолжить применение препарата в соответствии с рекомендованной схемой его применения.

18. При применении Риботана в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

19. Сведения о взаимодействии Риботана с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

20. Продукцию животного происхождения, в том числе молоко, после введения животному Риботана можно использовать без ограничений.

#### **IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

21. При работе с Риботаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Риботаном.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

С утверждением настоящей Инструкции отменяется Инструкция по применению иммуномодулятора Риботан, утвержденная Россельхознадзором 08 октября 2012 года.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ЗАО фирма «Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр» («ВЕТЗВЕРОЦЕНТР»), 129337, Москва, Хибинский пр-д, д. 2.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ЗАО фирма «Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр» («ВЕТЗВЕРОЦЕНТР»), 129337, Москва, Хибинский пр-д, д. 2.